

BASIC LIFE SUPPORT

При вртоглавица или губење на свест на стоматолошка столица пациентот се поставува во:

- A) седната положба
- B) полуседната положба
- C) легната положба
- D) легната положба со главата пониско од нозете

При анафилактичен шок прво се дава

- A) адреналин
- B) кортикостероид
- C) антихистаминик
- D) витамини

При анафилактичен шок се дава адреналин интрамускулно во доза од:

- A) 0.1-0. ml
- B) 0.2-0.4 ml
- C) 0.6 ml
- D) 1 ml

При анафилактичен шок се дава адреналин интравенозно во доза од:

- A) 0.1 ml
- B) 0.2 ml
- C) 0.3 ml
- D) 0.4 ml

При анафилактичен шок освен адреналин по потреба се дава и:

- A) кортикостероид
- B) антихистаминик
- C) калциум
- D) се горе наведено

При колапс на пациент прво се прави

- A) Рачна масажа на срце
- B) Вештачко дишење
- C) Се проверува дали пациентот е контактибилен
- D) Се повикува неговиот матичен доктор

При давање прва помош соодносот на вештачко дишење со масажа на срце е:

- A) 2 вештачки дишења на 30 компресии
- B) 1 вештачко дишење на 5 компресии
- C) 3 вештачки дишења на 15 компресии
- D) 2 вештачки дишења на 100 компресии

Пулсот се проверува на

- A) радијалната артерија
- B) улнарната артерија
- C) каротидната артерија
- D) темпоралната артерија

Кој е знак за обструкција на дишните патишта?

- A) Слаба вентилација
- B) Свирење и висок тон при вдишување
- C) Неможност за говор
- D) Сите горе наведени

При вртоглавица или краткотрајно губење на свест на стоматолошка столица пациентот се поставува во легната положба со главата пониско од нозете и се врши притисок врз

- A) Градите
- B) Стомачните мускули
- C) Се масираат рацете
- D) Се масира главата