

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА-ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕ

Тризмус од дентално потекло е последица на инфекција на еден од следните анатомски простори:

- A) темпорален
- B) птеригомандибуларен
- C) субмандибуларен и беклардов триаголник
- D) парафарингеален
- E) сите одговори се неточни

Билатерална фрактура на мандибулата во ментална регија е ургентна состојба поради :

- A) дисфагија
- B) бесознание
- C) дисфункција на јазикот
- D) абдантно крварење
- E) дислалија

Во кој од наведените случаи на забот не мора да се извади иако се наоѓа во фрактурна линија?

- A) ако е лекуван
- B) ако е витален
- C) ако е авитален
- D) ако е пародонтопатичен
- E) ако е скршен во горната третина на алвеолата

Кај билатерални скршеници на colum mandibule постои:

- A) латерална апертогнатија
- B) вкрстен загриз на едната страна
- C) апертогнатија
- D) оневозможени латерални движења
- E) сите одговори се неточни

Карцином на долната усна е најчесто застапен ?

- A) 1-5 годишна возраст
- B) 6-7 годишна возраст
- C) 60 - 70 годишна возраст
- D) 20 - 25 годишна возраст
- E) сите одговори се неточни

Карцином на максилофацијалната регија се класифицира по ?

- A) ТНМ класификација
- B) МНС класификација
- C) ЛКМ класификација
- D) ЦЕР класификација
- E) сите одговори се неточни

Кои се методите за репозиција при скршеница на зигоматичната коска?

- A) метода по Federspiel
- B) метода по Gilles
- C) метода по Kingsley
- D) метода по Dingman
- E) суспензија по Adams

Кој е најчест тип на саливарна патологија кај деца?

- A) саливарни фистули
- B) сијаполитијаза
- C) сарком
- D) епидемичен паротитис
- E) сите одговори се неточни

Која од наведените состојби не е симптом при скршеница на зигоматичната коска?

- A) птоза
- B) парестезија
- C) периорбитален хематом
- D) отежнато отварање на уста
- E) сите одговори се неточни

Најчесто применувана оперативна метода во терапија на карцином на добра усна е?

- A) циркумзиција
- B) ромбоидна екзиција
- C) квадратеста екзиција
- D) триангуларна екзиција
- E) сите одговори се неточни

Параметар за успешност во третман на малигни оболувања е:

- A) 5 месечно преживување
- B) 5 неделно преживување
- C) 5 годишно преживување
- D) 1 годишно преживување
- E) сите одговори се неточни

Парестезија е најчест симптом при фрактура на :

- A) фрактура corporis mandibulae
- B) фрактура anguli mandibulae
- C) фрактура colli mandibulae
- D) фрактура proc. alveolaris mandibulae
- E) фрактура processus coronoidei

Предканзерозни состојби на карцином на долна усна се :

- A) леукоплакија
- B) псоријаза
- C) Sjogren Syndrom
- D) пемфигус
- E) сите одговори се неточни

Временскиот тајминг за третман на максиларните фрактури кои се третираат со максило-мандибуларна фиксација со жица, изнесува минимум:

- A) 2-4 недели
- B) 4-6 недели
- C) 7-10 дена
- D) 6-8 недели
- E) сите се неточни

Имунолошко пореметување кое се манифестира на плунковните жлезди е:

- A) сијалолитијаза
- B) паротидис епидемика
- C) MUMPS
- D) примарен Sjogren SY
- E) сите се неточни

Инцизија за дренажа на дентален абцес треба доволно да се изведе за да ја опфати само:

- A) мукозата и субмукозата
- B) поткожното ткиво со анатомската содржина
- C) се додека не се наиде на крвен сад
- D) сите се точни
- E) ниту еден не е точен

Кај пациенти алергични на пеницилин се администрацира:

- A) clarithromycin и clindamycin
- B) пеницилин
- C) се лекува исклучиво хируршки без антибиотик
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Кои од наведените грани на тригеминален нерв се почесто зафатени при постоење на тригеминална невралгија:

- A) максиларен и мандибуларен нерв
- B) мандибуларен и акцесорен нерв
- C) офтальмикус
- D) супраорбитален
- E) ниту еден

Кој од наведените материјали и методи се применуваат кај Ле Форт фрактури на максила:

- A) биоресорптивни плочки
- B) биоресорптивни и титаниумски мини плочки
- C) интраоперативна КТМ и 3Д КТ реконструкција
- D) сите наведени
- E) ниту еден

Кој од наведените техники се користат за корекција на лингвален френулум во претпротетска хирургија:

- A) V-Y инцизија
- B) Z-пластика _____
- C) ласер френектомија
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Кој од следниве техники се применуваат кај пациент со расцеп:

- A) Schuchardt
- B) Caldwell-Luc
- C) двојна Z-пластика, von Langenbeck
- D) Dal Pont
- E) Obwegeser, Gilles

Која е најчесто применувана доза во терапијата со депопеницилин?

- A) 80.000 до 160.000 I IE
- B) 8.000 до 16.000 I IE
- C) 180.000 до 1.600.000 I IE
- D) 800.000 до 1.600.000 I IE
- E) сите одговори се неточни

Максиларна фактурна линија која ги инволвира носните, максиларните и палатиналните коски, инфериорните 2/3 од назален септум, дентоалвеоларната коска и птеригоидните продолжетоци се именува како:

- A) Ле Форт 1
- B) Ле Форт 2
- C) Ле Форт 3
- D) Guerin фактура
- E) ниту еден

Максиларниот синус природно се дренира преку:

- A) среден носен ходник hiatus seminularis
- B) не се дренира
- C) ороантрална фистула
- D) concha nasalis superior
- E) сите се неточни

Најчести видови на инфекции во максилофацијалната регија се:

- A) целулитис, абсцес и флегмона
- B) лимфаденитис
- C) остеомиелитис
- D) сите наведени
- E) ниту еден

Одонтогените тумори се класифицираат во:

- A) епителни
- B) мезенхимални
- C) мешани
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Одонтогените цисти можат да бидат:

- A) примарни и секундарни
- B) инфламаторни и развојни
- C) хомогени и алогени
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Остеомиелитис кај возрасни најчесто се јавува во :

- A) максила
- B) мандибула
- C) зигоматична коска
- D) носни коски
- E) TMJ

Остеомиелитис може да биде:

- A) акутен и хроничен
- B) прогресивен и хематоген
- C) рекурентен и мултифокален
- D) склерозирачки и супуративен
- E) сите наведени

Првиот оперативен третман кај расцеп на непце се применува:

- A) пред 9 месеци
- B) 2-5 години
- C) 9-18 месеци
- D) не се третира се до 18 години
- E) сите се неточни

Развојната фаза на дентогена инфекција во прв стадиум на инокулација (едем) трае:

- A) 5 дена
- B) 3-7 дена
- C) 0-3 дена
- D) не постои фаза на инокулација
- E) сите се неточни

Расцеп на непце претставува:

- A) Cheilognathopalatoshisis
- B) Uvuloshisis
- C) Хеилопластика
- D) Палатопластика
- E) Palatoshisis

Расцеп на усна и непце се вика:

- A) Cheilognathopalatoshisis
- B) Uvuloshisis
- C) Хеилопластика
- D) Палатопластика
- E) Palatoshisis

Расцеп на усна, алвеоларен продолжеток и непце, претставува :

- A) терциерно непце
- B) palatoshisis
- C) cheilosisis
- D) примарно непце
- E) cheilognatopalatoshisis

Слузокожата кај sinus maxillaries chronica се карактеризира со:

- A) хиперпластична слузокожа која е едематозно и полипозно изменета
- B) отсуство на слузокожа и полип
- C) асимптоматски карактеристики
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Со оглед на почетокот и текот на инфекцијата, таа може да биде:

- A) акутна
- B) субакутна
- C) хронична
- D) рецидивирачка
- E) сите наведени

Флегмона basiss oris е синоним за продор на инфекција во следниве анатомски простори:

- A) субмандибуларен, сублингвален , птеригомандбиуларен
- B) субмандибуларен, субментален и сублингвален
- C) субментален, сублингвален и субмасетеричен
- D) инфраорбитален, букален, суперфицијален и темпорален
- E) ниту едно од наведените

Формирање на калциумкарбонатни/калциумфосфатни каменчиња во плунковна жлезда, најчесто унилатерално станува збор за:

- A) сијалоаденитис
- B) сијалолитијаза
- C) сијалоаденоза
- D) функционално способни плунковни жлезди
- E) сите се неточни

Foramen mentale се наоѓа во предел на:

- A) Апексот на вториот премолар
- B) Апексот на вториот молар
- C) Апексот на централните инцизиви
- D) Апексот на канините
- E) Апексот на првиот премолар

Radix relicta е:

- A) Длабоко фрактуриран корен
- B) Фрактуриран корен кој делумно е видлив на преглед
- C) заостанат корен
- D) импактиран корен
- E) сите одговори се неточни

Како резултат на некомплетно одстранување на оригиналната циста се јавува:

- A) Радикуларна циста
- B) Фоликуларна циста
- C) Латерална циста
- D) Резидуална циста
- E) глобуломаксиларна

Клетките се чувствителни на рентген зрачење пропорционално со брзината на нивната делба, а обратно пропорционално со:

- A) Степенот на нивната зрелост
- B) Степенот на нивната диференцијација
- C) Степенот на нивната ДМК фаза
- D) Степенот на нивната сензитивност
- E) сите наведени

Кружна форма јасно дефинирани граници, и дијаметар поголем од 2цм се карактеристики на:

- A) Одонтогена кератоциста
- B) Латерална пародонтална циста
- C) Радикуларна циста
- D) Резидуална циста
- E) Фоликуларна циста

Адекватен оперативен третман на големи цистиво максила е:

- A) цистектомија и екстракција на забот причинител
- B) само цистектомија
- C) масупијализација
- D) сегментна ресекција на виличната коска
- E) сите одговори се неточни

Дифузно воспаление во меките ткива е :

- A) периостит
- B) остеомиелит
- C) целулит
- D) остеит
- E) сите одговори се неточни

Една од наведените состојби не претставува индикација за радикална операција на максиларниот синус по Caldwell- Luc:

- A) акутен максиларен синузит
- B) циста на максиларниот синузит
- C) полип на максиларниот синузит
- D) хроничен максиларен синузит
- E) сите одговори се неточни

За најдобра визуелизација на паназалните шуплини и cavum nasi најчесто користена РТГ метода е:

- A) РТГ по Hurtz
- B) Ап- краниограм
- C) аксијална проекција
- D) ретроалвеоларна снимка
- E) сите одговори се неточни

Инфекцијата во сублингвалниот простор настанува од ?

- A) долни инцизиви
- B) горни инцизиви
- C) горни и долни инцизиви
- D) долни инцизиви и долни молари
- E) сите одговори се неточни

Кај пациенти со хроничен сиалоаденит на субмандибуларната плунковна жлезда, пропратен со сиалолитијаза и чести егзацербации, адекватен третман е :

- A) екстирпација на плунковата жлезда
- B) марсупијализација
- C) конзервативен третман со антибиотици
- D) бужирање на изводниот канал
- E) прилагодување на исхраната

Која од следните состојби е индикација за марсупиелација?

- A) кај сите мекоткивни цисти
- B) кај сите развојни цисти
- C) кога има голема можност за рецидив
- D) периодонтитис хроника
- E) сите одговори се неточни

Оперативната метода по Caldwell-Luc е наменета за операција на :

- A) максиларен синус
- B) етмоидални синуси
- C) брахиогена циста
- D) субмандибуларен простор
- E) тиреоглосна циста

При оперативно отстранување на цисти во максила со палатинален пристапо најчесто се користат резови по :

- A) Wasmund-rehrmann
- B) Pichler
- C) Peter
- D) Mathis
- E) Rehrmann

Развојни одонтогени цисти се :

- A) назолабијална циста
- B) парадонтални
- C) резидуална циста
- D) стикални цисти
- E) фоликуларна циста