

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕ

Foramen mentale се наоѓа во предел на:

- A) Апексот на вториот премолар
- B) Апексот на вториот молар
- C) Апексот на централните инцизиви
- D) Апексот на канините
- E) Апексот на првиот премолар

Radix relictа е:

- A) Длабоко фрактуриран корен
- B) Фрактуриран корен кој делумно е видлив на преглед
- C) заостанат корен
- D) импактиран корен
- E) сите одговори се неточни

Дезинфекција се изведува со помош на:

- A) биолошки материјали
- B) антибиотици
- C) хемиски средства
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

Како резултат на апикотомија може да се јави

- A) Пародонтална болест
- B) Кондезирачки остеоитис
- C) Хирушки дефект
- D) Кариес
- E) Пародонтален џеб

Како резултат на некомплетно одстранување на оригиналната циста се јавува:

- A) Радикуларна циста
- B) Фоликуларна циста
- C) Латерална циста
- D) Резидуална циста
- E) глобуломаксиларна

Кружна форма јасно дефинирани граници, и дијаметар поголем од 2цм се карактеристики на:

- A) Одонтогена кератоциста
- B) Латерална пародонтална циста
- C) Радикуларна циста
- D) Резидуална циста
- E) Фоликуларна циста

Латерално од коренот на забот се јавуваат :

- A) Латерална пародонтална циста
- B) Одонтогена кератоциста
- C) Радикуларна циста
- D) Резидуална циста
- E) Фоликуларна циста

Нормален сијалогрфски наод со т.н дрво со снег е карактеристичен за:

- A) Паротидна жлезда
- B) Субмандибуларна
- C) Сублингвална жлезда
- D) Мали плункови жлезди на палатумот
- E) Мали плункови жлезди усните

Опиши ја болката при алвеолитис. Таа се јавува по:

- A) Од 7-10 ден по екстракцијата
- B) Од 2-3 ден по екстракцијата
- C) од 6-7 ден по екстракцијата
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

При асептична рана кога во истата нема дефект на ткивото, а рабовите на раната се интимно поврзани, санацијата се одвива со минимално формирање на сврзно колагено ткиво. За ваквото зараснување на раната велиме дека е:

- A) Sanatio per secundam intentionem
- B) Sanatio per primam intentionem
- C) Sanatio per tertiam intentionem
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

Работните краци на клештите за вадење на заби во долната вилица се:

- A) под агол во однос на рачките
- B) во иста осовина со рачките
- C) еднакви по должина со рачките и се под агол во однос на рачките
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

Радиолусцентниот простор помеѓу забот и ламина дура претставува?

- A) цемент на коренот на забот
- B) трабекуларна коскена ламина
- C) периодонтален спациум
- D) сите наведени
- E) компактна коскена ламина

Сепарација на фрактурирани корени на долни молари се врши:

- A) во буко-лингвален правец
- B) во мезио-дистален правец
- C) и во буко-лингвален и во мезио-дистален правец
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

Сепарацијата на корените на горен прв премолар се врши:

- A) во буко-лингвален правец
- B) во мезио-дистален правец
- C) и во буко-лингвален и во мезио-дистален правец
- D) сите одговори се неточни
- E) сите одговори се точни

Glossirozata често е пропратена со симптом на:

- A) избразденост на јазикот
- B) обложеност на јазикот
- C) крварење на јазикот
- D) улцерозни промени на јазикот
- E) верикозни промени

Ако има гноен ексудат тој укажува на

- A) типот на инфламаторни промени на мекиот сид
- B) длабочината на пародонталниот џеп
- C) интензитетот на деструкцијата на пародонтот
- D) инфекција со фузоспирохети
- E) улцерации на мекиот сид

Активирањето на денталниот фокус се случува при:

- A) траума при цвакањето, создавање на гасови во радикс
- B) отстранување на меки забни наслаги
- C) екстракција на заби
- D) намалување на циркулацијата во перифокалното ткиво
- E) трепанација на заби

На што е последица на Granuloma pyogenicum:

- A) хронична инфламација
- B) медикаментозна интоксикација
- C) акутна инфламација
- D) алергична реакција
- E) сите одговори се неточни

Кое од долу наведените е контраиндикација за примена на гивектомија :

- A) супракоскени џепови
- B) џепови подлабоки од 3мм
- C) гингивална хипертрофија
- D) џеп кој се екстендира под мукогингивалната граница
- E) плитки инфракоскени џепови

Мултиплите пародонтални апсцеси како компликација на пародонталното заболување може да се јават кај:

- A) анемија
- B) морбус Адисон
- C) хипертензија
- D) имун дефицит
- E) агранулоцитоза

Granuloma pyogenicum може да се сретне на:

- A) на гингивата, јазикот и усните
- B) исклучиво само гингивата
- C) исклучиво само усните
- D) исклучиво само јазикот
- E) сите одговори се неточни

Дехисценција е :

- A) оголување на коренот пропратено секогаш со рецесија на гингива
- B) оголување на коренот поради одсуство на коска
- C) оголување на коренот каде лимбус алвеоларис е 3мм
- D) оголување на коренот е само од орално
- E) оголување на коренот е само од апроксимално

Излезот на главниот изведен канал на паротидната жлезда-ductus parotideus-Ste nononi, означена како papilla parotidea се наоѓа

- A) Во висина на горниот втор молар
- B) Во висина на оклузалната линија на горните заби
- C) На ниво на Plica sublingualis
- D) Во regio submandibulare
- E) Веднаш под долните премолари

Кај бактерискиот сиалоденит терапијата е:

- A) антибиотска
- B) антихистаминска
- C) цитостатици
- D) кортикостероиди
- E) хормонска

Кај кое заболување потребно е да се направи дренажа:

- A) Хронична пародонтопатија
- B) Локализирана агресивна пародонтопатија
- C) Генерализирана агресивна пародонтопатија
- D) Улцеронекрзна пародонтопатија
- E) Пародонтален абсцес

Кај пациенти кои примаат радио терапија, поради појавата на радијационен синдром не смее да се изведуваат следните интервенции:

- A) екстракција на забите и обработка на пародонтални џепови
- B) миење на заби и отстранување на меки наслаги
- C) да се аплицираат капки Нистатин
- D) испирање на устата со благи дезинфекциони средства
- E) да се примаат витамини

Како се нарекуваат дефектите на алвеоларната коска во вид на прозорче?

- A) дехисценција
- B) фенестрација
- C) адхезија
- D) адхеренција
- E) сите одговори се неточни

Карактеристичниот рентгенолошки наод за пародонталниот абсцес опфаќа:

- A) Истенчување и губење на остријата на ламина дура на алвеоларната коска
- B) Хоризонтален и вертикален губиток на алвеоларната коска
- C) ограничена радиолусцентна зона долж сидовите на коренот на забот
- D) сите одговори се точни
- E) нема точен одговор

Кога се изведува гингивопластика:

- A) наследна фиброматоза
- B) медикаментозно условена хиперплазија
- C) кога е потребно да се вратат физиолошките контури на ткивото
- D) сите одговори се точни
- E) нема точен одговор

Кое заболување од следниве се карактеризира со присуство на тумефакција:

- A) Хронична пародонтопатија
- B) Локализирана агресивна пародонтопатија
- C) Генерализирана агресивна пародонтопатија
- D) Улцеронекрзна пародонтопатија
- E) Пародонтален абсцес

Авулзија е :

- A) коренска фрактура
- B) коронарна фрактура
- C) патолошка луксација на забите
- D) потполно избивање на забот од алвеолата
- E) комбинирана фрактура

Во каков медиум треба да се траспортира забот при негова авулзија?

- A) во стерилна газа
- B) во раствор на хидроген
- C) под јазик
- D) во вода
- E) млеко

Која е најчестата хронична дентогена инфекција во детска возраст?

- A) флегмона на образот
- B) флегмона на подот на усната празнина
- C) целулит
- D) абсцес на субменталниот предел
- E) парулис

Која е постапката при крвави стоматолошки интервенции кај пациенти заболени од Хемофилија ?

- A) се бара писмена согласност од хематолог
- B) се интервенира без согласност
- C) се интервенира внимателно
- D) се интервенира со примена на локална анестезија
- E) сите одговори се неточни

Реимплантација е :

- A) повторно враќање на забот во алвеолата
- B) фиксирање на забот
- C) враќање на забот во нормална позиција
- D) прекривање на фрактурна линија
- E) сите одговори се неточни

Симптоми при анкилоза на заб се :

- A) тап звук при перкусија
- B) метален звук при перкусија
- C) сонорен звук при перкусија
- D) сите одговори се точни
- E) сите одговори се неточни

Epulis gigantocellularis е тумор на ?

- A) јазикот
- B) оралната слузница
- C) на вермилионот
- D) на палатумот
- E) на гингивата

Кои се фазите на развој на дентогени апсцеси ?

- A) интраосеална
- B) субкутана
- C) субпериостална
- D) сите одговори се точни
- E) субмукозна

Апикотомија како избор на терапија постои кај:

- A) periodontitis apicalis chronica fibrosa
- B) periodontitis apicalis chronica granulomatosa circumscripta
- C) periodontitis apicalis chronica difusa
- D) латерален пародонтитис
- E) periodontitis apicalis acuta purulenta

Инцизија и дренажа се прави при:

- A) Апцес
- B) Гангрена
- C) Хиперемија
- D) Некроза
- E) Серозен пулпит

Една од наведените состојби не претставува индикација за радикална операција на максиларниот синус по Caldwell- Luc:

- A) акутен максиларен синусит
- B) циста на максиларниот синусит
- C) полип на максиларниот синусит
- D) хроничен максиларен синусит
- E) сите одговори се неточни

Инфекцијата во сублингвалниот простор настанува од ?

- A) долни инцизиви
- B) горни инцизиви
- C) горни и долни инцизиви
- D) долни инцизиви и долни молари
- E) сите одговори се неточни

Која од следните состојби е индикација за марсупиелизација?

- A) кај сите мекоткивни цисти
- B) кај сите развојни цисти
- C) кога има голема можност за рецидив
- D) периодонтитис хроника
- E) сите одговори се неточни

При оперативно отстранување на цисти во максила со палатинален пристап најчесто се користат резови по :

- A) Wasmund-rehrmann
- B) Pichler
- C) Peter
- D) Mathis
- E) Rehrmann

Развојни одонтогени цисти се :

- A) назолабијална циста
- B) парадонтални
- C) резидуална циста
- D) стикални цисти
- E) фоликуларна циста

Цистите имаат:

- A) инфилтративен раст
- B) експанзивен раст
- C) сфероиден раст
- D) инволутивен раст
- E) сите одговори се неточни

Инцизија за дренажа на дентален абсцес треба доволно да се изведе за да ја опфати само:

- A) мукозата и субмукозата
- B) поткожното ткиво со анатомската содржина
- C) се додека не се најде на крвен сад
- D) сите се точни
- E) ниту еден не е точен

Кај пациенти алергични на пеницилин се администрира:

- A) clarithromycin и clindamycin
- B) пеницилин
- C) се лекува исклучиво хируршки без антибиотик
- D) сите се точни
- E) ниту еден

Максиларниот синус природно се дренира преку:

- A) среден носен ходник hiatus seminularis
- B) не се дренира
- C) ороантрална фистула
- D) concha nasalis superior
- E) сите се неточни

Остеомиелитис кај возрасни најчесто се јавува во :

- A) максила
- B) мандибула
- C) зигоматична коска
- D) носни коски
- E) ТМЗ